UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES EXTERNOS
Servicio de Farmacia - Hospital Universitario La Fe
INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

Tel.: +34 961 97 32 35
Correo-e: ufpe.lafe@gmail.com
http://webs.ono.com/ufpe-lafe

OXIBATO DE SODIO

¿Qué es y para qué se utiliza?

Tratamiento de la narcolepsia (ataques de sueño) con cataplejía (debilidad muscular extrema) en pacientes adultos. Actua facilitando el sueño nocturno.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

XYREM SOL 500MG/ML 180ML E/1

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente.

Una vez abierto, el periodo de validez del medicamento es de 40 días.

Consúmalo antes de 24 horas tras su dilución en los vasos dosificadores.

¿Cómo se administra?

Oxibato de sodio debe tomarse en ayunas (2-3 horas despues de cenar).

La dosis que debe tomar es muy variable, pero siempre repartida en dos tomas por la noche (la primera dosis al acostarse y la segunda dosis de 2,5 a 4 horas después). Tome siempre la dosis prescrita por su médico y nunca la modifique por su cuenta.

Deberá diluir con agua la dosis prescrita en los vasos dosificadores antes de tomarla (hasta 60 ml). Se recomienda preparar las dos dosis antes de acostarse.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

En caso de que olvide la primera dosis, tómela lo antes posible y continue con el procedimiento descrito previamente.

Si olvida la segunda dosis, no tome oxibato sódico hasta la noche siguiente.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿ Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Los mas frecuentes son mareos, nauseas y dolor de cabeza.

En caso de sobredosis puede aparecer agitación, movilidad alterada, sudoración y visión borrosa.

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de oxibato sódico. El uso de fármacos depresores del sistema nervioso central (por ejemplo sedantes o antidepresivos) durante el tratamiento con oxibato sódico puede potenciar su efecto.

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico.

NO debe ingerir ALCOHOL durante el periodo en el que esté siendo tratado con oxibato sódico.

Este medicamento contiene sodio, es posible que necesite reducir la ingesta de sodio en la dieta, especialmente si es hipertenso.

No se recomienda el uso de oxibato sódico durante el embarazo. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. Las mujeres no deben dar el pecho durante el tratamiento con oxibato sódico.

Oxibato sódico puede producir somnolencia o pensamientos anormales. No conduzca vehículos o maquinaria pesada ni realice actividades que requieran una especial alerta mental hasta trascurridas 6 horas desde la última toma de oxibato sódico ni durante los primeros días de tratamiento con oxibato sódico.

La interrupción del tratamiento puede agravar su enfermedad (aumento del número de crisis de cataplejia). Nunca deje de tomarlo a no ser que se lo indique su médico.

Excipientes de declaración obligatoria

Sales de sodio.

Identificación

Solución oral clara.

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

8	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	22	23

OBSERVACIONES:

_____

_____

_____

_____

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO