



## TRIFLURIDINA



### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Trifluridina está indicada en el tratamiento de pacientes adultos con cáncer colorrectal metastásico (CCRm) que han recibido previamente otros tratamientos o no se les considere candidatos al tratamiento con terapias disponibles.

### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

LONSURF Comp 15/6, 14 MG E/20

LONSURF Comp 20/8, 19 MG E/20

### ¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (inferior a 30°C) y en su envase original.

### ¿Cómo se administra?

Trifluridina se administra por vía oral. Los comprimidos se deben tomar enteros con un vaso de agua inmediatamente después del desayuno y de la cena. Lave sus manos después de manipular este medicamento.

Su médico decidirá la dosis correcta para usted (la dosis depende de su peso y altura), y le dirá cuántos comprimidos debe tomar cada vez.

Cómo tomarlo:

Tomará Trifluridina 10 días durante las 2 primeras semanas, y después descansará 2 semanas. Este periodo de 4 semanas es un "ciclo", que consiste en:

- Semana 1: tome la dosis 2 veces al día durante 5 días. Después descanse 2 días (no tome el medicamento).
- Semana 2: tome la dosis 2 veces al día durante 5 días. Después descanse 2 días (no tome el medicamento).
- Semana 3: No tome el medicamento
- Semana 4: No tome el medicamento

A continuación empezará otra vez otro ciclo de 4 semanas siguiendo el esquema anterior.

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida una dosis, tómela tan pronto como sea posible, salvo que falten menos de 6 h para la siguiente dosis. Nunca tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Las reacciones adversas observadas con mayor frecuencia (y más graves) incluyen:

- Toxicidad gastrointestinal (náuseas, diarrea, vómitos, disminución del apetito). Consulte a su médico si los vómitos y la diarrea son graves o persistentes (puesto que pueden producir deshidratación) y si tiene dolor intenso de estómago o abdominal, fiebre o inflamación del abdomen.
- Trastornos de la sangre (anemia, neutropenia, leucopenia, trombocitopenia). Estas alteraciones se detectan en pruebas analíticas. Su médico estará atento a estos efectos adversos en los resultados de sus análisis, no obstante informe a su médico inmediatamente si experimenta cualquiera de los siguientes efectos adversos graves: sensación de dificultad para respirar, cansancio o palidez (Anemia); escalofríos, fiebre, sudoración u otros signos de infección (neutropenia); cardenales o sangrado inusual (trombocitopenia).
- Fatiga o cansancio intenso.

Otros efectos adversos frecuentes son: alteración del gusto (sabor metálico), neuropatía periférica (pérdida de sensibilidad, dolor, debilidad), mareo, cefalea (dolor de cabeza), insomnio, infecciones del tracto respiratorio superior, tos, disnea (dificultad para respirar), síndrome de eritrodisestesia palmoplantar (enrojecimiento, hinchazón y dolor en las palmas de las manos y/o las plantas de los pies), erupción cutánea, alopecia, prurito (picor), piel seca, hiperbilirrubinemia (aumento de la bilirrubina en sangre), dolor abdominal, estreñimiento, estomatitis (Inflamación de la mucosa bucal).

Efecto adverso grave, pero muy poco frecuente: embolia pulmonar (curso con dificultad para respirar y dolor en el pecho o en las piernas).

### Observaciones

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o tuviera que tomar cualquier otro medicamento. Esto incluye los medicamentos adquiridos sin receta y los medicamentos a base de plantas.

Trifluridina puede afectar al modo de actuación de otros medicamentos y otros medicamentos pueden afectar al modo de actuación de Trifluridina.

**Excipientes de declaración obligatoria**

Lactosa

**Identificación**

- Lonsurf 15 mg es un comprimido recubierto con película, blanco, biconvexo, redondo, grabado con "15" en un lado, y "102" y "15 mg" en el otro lado, en tinta gris.
- Lonsurf 20 mg es un comprimido recubierto con película, rojo pálido, biconvexo, redondo, grabado con "20" en un lado, y "102" y "20 mg" en el otro lado, en tinta gris.



**ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN**

**PACIENTE:** \_\_\_\_\_

	8		10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22	23	

OBSERVACIONES:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Y recuerde.....**

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO  
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**