



## ELTROMBOPAG

### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Eltrombopag está indicado en pacientes adultos con púrpura trombocitopénica inmune (PTI) crónica que son refractarios a otros tratamientos.

### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

REVOLADE COMP 25MG E/28

REVOLADE COMP 50MG E/28

### ¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente y proteger de la luz.

### ¿Cómo se administra?

Eltrombopag se administra por vía oral. La dosis inicial habitual es de 50 mg una vez al día. Su médico podrá modificar esta dosis según su recuento de plaquetas. Tome siempre la dosis indicada por su médico.

No tome eltrombopag en las 4 horas antes o después de tomar:

- Alimentos lácteos como queso, mantequilla, yogur o helado
- Leche o batidos de leche, bebidas hechas con leche, yogur o crema
- Antiácidos (medicamentos para la indigestión)
- Algunos suplementos de vitaminas y minerales, incluyendo hierro, calcio, magnesio, aluminio, selenio y zinc.

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado tomar una dosis, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada.

No tome una dosis doble para compensar un olvido.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Durante el tratamiento con eltrombopag pueden aparecer reacciones adversas que incluyen:

- Dolor de cabeza, insomnio, parestesias (sensibilidad general que se manifiesta por una sensación de hormigueo, adormecimiento, acorchamiento, etc)
- Fatiga, edema periférico (hinchazón de manos, tobillos o pies)
- Dolor muscular, óseo y de las articulaciones.
- Cataratas, ojo seco.
- Molestias gastrointestinales (náuseas, diarrea, dolor abdominal, estreñimiento)
- Erupción, prurito, caída del cabello.
- Recuentos de plaquetas elevados, alteraciones hepáticas, mayor riesgo de coágulos de sangre y de sangrado tras la interrupción del tratamiento.

En el caso de aparición de éstos o cualquier otro tipo de efectos consulte a su médico o farmacéutico.

### Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de eltrombopag. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si quedara embarazada durante el mismo informe inmediatamente a su médico. Se desconoce si eltrombopag puede excretarse por leche materna. Antes de iniciar la lactancia materna, consulte con su médico.

### Excipientes de declaración obligatoria

### Identificación

REVOLADE® se presenta en blisters de aluminio en un estuche conteniendo 28 comprimidos recubiertos con película.



## ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: \_\_\_\_\_

	8		10	11	12	13		15	16	17	18	19		20		22	23	

OBSERVACIONES:

---



---



---



---

### Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO  
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO