



SOFOSBUVIR



¿Qué es y para qué se utiliza?

Sofosbuvir es un agente antiviral indicado en el tratamiento de la hepatitis C crónica en combinación con otros antivirales. No debe ser administrado como monoterapia.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

SOVALDI 400 MG 28 COMP

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (25°C) y en el embalaje original para protegerlo de la luz y de la humedad.

¿Cómo se administra?

Los comprimidos deben tomarse por vía oral acompañados de alimentos. Trague el comprimido entero. No mastique, machaque ni parta el comprimido, ya que tiene un sabor muy amargo. Informe a su médico o farmacéutico si tiene problemas para tragar los comprimidos.

Si vomita en menos de 2 horas después de tomar sofosbuvir, tome otro comprimido. Si vomita tras más de 2 horas después de tomarlo, no es necesario que tome otro comprimido hasta el próximo que tiene programado de forma regular.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Sofosbuvir se administra cada 24 horas. En caso de que olvide una dosis siga las siguientes instrucciones:

- Si se da cuenta en el plazo de 18 horas desde el momento en que toma sofosbuvir habitualmente, debe tomar el comprimido lo antes posible. A continuación, tome la siguiente dosis a la hora habitual.
- Si se da cuenta tras 18 horas o más desde el momento en que toma sofosbuvir habitualmente, espere y tome la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

En general, sofosbuvir es bien tolerado. Los efectos adversos más frecuentes del tratamiento combinado son: cefalea (dolor de cabeza), diarrea, náuseas, astenia (cansancio y fatiga) e insomnio (problemas para dormir).

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de sofosbuvir cuando se administran conjuntamente, dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. Asimismo, sofosbuvir también puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar dos métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento y hasta 4 meses posteriores a su finalización. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico.

Se desconoce si sofosbuvir puede excretarse por leche materna. No se recomienda la lactancia materna durante el tratamiento.

Excipientes de declaración obligatoria

Identificación

Sovaldi® 400 mg se presenta en forma de comprimidos recubiertos con película de color amarillo y con forma de cápsula, con "GSI" grabado por un lado y "7977" por el otro.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

	8	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	22	23

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**