



## DASABUVIR



### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Dasabuvir está indicado en combinación con otros medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C crónica en adultos. No debe ser administrado como monoterapia.

### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

EXVIERA 250 MG COMP RECUB E/56

### ¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (25°C) y en el embalaje original para protegerlo de la luz y de la humedad.

### ¿Cómo se administra?

Dasabuvir debe tomarse por vía oral CON alimentos. Debe tragar los comprimidos enteros, sin masticar ni machacar. La dosis recomendada es de un comprimido dos veces al día (mañana y noche).

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado una dosis, debe tomar la dosis olvidada en un plazo de 6 horas. Si han pasado más de 6 horas después de la hora habitual de la toma de dasabuvir, no tome la dosis omitida y reanude la toma a la hora habitual prevista.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados a dasabuvir en combinación con ombitasvir/paritaprevir/ritonavir y/o ribavirina se encuentran: náuseas, insomnio (problemas para dormir), picor, astenia, fatiga y anemia.

Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

### Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de dasabuvir cuando se administran conjuntamente, dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

No tome HIERBA de SAN JUAN durante el tratamiento.

El tratamiento combinado de dasabuvir con Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir y/o ribavirina puede influir en la capacidad de conducción ya que se ha asociado con la aparición de fatiga.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si una paciente quedara embarazada durante el mismo, debe informar inmediatamente a su médico. Se desconoce si dasabuvir se excreta por leche materna. Se recomienda interrumpir la lactancia antes de iniciar el tratamiento con dasabuvir.

### Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa

### Identificación

Comprimidos recubiertos con película, de color beige, ovalados y con "AV2" grabado por un lado.



## ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: \_\_\_\_\_

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

OBSERVACIONES:

---



---



---



---

### Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO  
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO