



CICLOSPORINA SOLUCIÓN



¿Qué es y para qué se utiliza?

Medicamento inmunosupresor indicado para prevenir el rechazo de un órgano sólido o médula ósea trasplantada. También se utiliza en el tratamiento de algunas enfermedades de origen autoinmune como: uveítis, psoriasis, síndrome nefrótico, artritis reumatoide y dermatitis atópica.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

SANDIMMUN SOL ORAL 50 ML E/1

¿Cómo se debe conservar?

La solución debe conservarse entre 20 y 30°C. Por debajo de 20°C puede aparecer una formación gelatinosa que desaparece a temperaturas superiores.

Una vez abierto el envase, desechar la solución a los 2 meses.

¿Cómo se administra?

Ciclosporina solución puede tomarse con o sin alimentos, pero siempre del mismo modo (con el mismo tipo de comida) y a la misma hora del día. NO tome zumo de POMELO y evite alimentos ricos en potasio (por ejemplo: plátanos, nueces, acelgas...) durante el tratamiento con ciclosporina.

La dosis debe tomarse diluida en un vaso de vidrio (no de plástico) con bebida a temperatura ambiente a base de chocolate, leche o zumo de frutas (por ej: zumo de naranja o manzana, NUNCA de POMELO), según preferencia de cada uno. La mezcla debe prepararse inmediatamente antes de su toma. Evitar que la jeringa entre en contacto con el diluyente y no enjuagarla (limpiar el exterior con un pañuelo de papel seco). Agitar bien antes de ingerir. Posteriormente, añadir un poco más de la bebida utilizada para asegurar que se ingiere toda la dosis.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Ciclosporina solución se administra normalmente cada 12 h. En caso de que olvide una dosis, tómela tan pronto como sea posible siempre que no hayan pasado 6 horas y continúe con el tratamiento manteniendo el horario habitual.

Si han pasado más de 6 horas desde el olvido: NO tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma para continuar con el tratamiento.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Las reacciones adversas más frecuentes son: incremento del vello en el cuerpo o en la cara (hirsutismo), temblor, hipertensión, cansancio, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, diarreas, hinchazón en las encías (hiperplasia gingival), sensación de quemazón en manos y pies, riesgo aumentado de infecciones, elevación de potasio y lípidos (grasas) en sangre. Alteración en el funcionamiento del riñón y del hígado.

Con menor frecuencia puede aparecer dolor de cabeza, erupciones de la piel, anemia moderada, aumento de niveles de azúcar en sangre, aumento de peso, hinchazón, calambres musculares y debilidad muscular.

Avise a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de ciclosporina cuando se administran conjuntamente, dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectiva. Asimismo, ciclosporina también puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos.

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

La interrupción del tratamiento puede aumentar las posibilidades de rechazo del órgano trasplantado. Nunca deje de tomarlo a no ser que se lo indique su médico.

Debe evitar exposiciones prolongadas a la luz del sol o a luz ultravioleta. También es recomendable el uso de protectores solares y cubrir el cuerpo frente a la luz solar.

Las vacunas pueden ser menos efectivas durante el tratamiento con ciclosporina, estando algunas contraindicadas. Consulte con su médico antes de vacunarse.

Mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz (preferiblemente no hormonal) durante el tratamiento. Ciclosporina no debe utilizarse durante el embarazo, si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. Las mujeres no deben dar el pecho durante el tratamiento con ciclosporina.

Excipientes de declaración obligatoria

Etanol 12%, propilenglicol, aceite de ricino.

Identificación

SANDIMMUN NEORAL® 50 ML se presenta en frascos de cristal ámbar de 50 mL, con un capuchón de sellado de plástico y tapón de goma. También incorpora un cierre de tapón de rosca para el período de uso. Además está provisto de un equipo dosificador. Cada mililitro de solución contiene 100mg de ciclosporina.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO