



## CAPECITABINA

### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Capecitabina es un agente citostático indicado en el tratamiento de distintas neoplasias.

### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

XELODA COMP 150MG E/60

XELODA COMP 500MG E/120

### ¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30°C).

### ¿Cómo se administra?

Capecitabina se debe tomar con agua dentro de los 30 minutos siguientes a una comida.

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Capecitabina se administra cada 12 h. En caso de que olvide una dosis, tómela tan pronto como sea posible siempre que no hayan pasado 6 horas y continúe con el tratamiento manteniendo el horario habitual.

Si han pasado más de 6 horas desde el olvido: NO tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma para continuar con el tratamiento.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son alteraciones gastrointestinales (especialmente diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, llagas en garganta y boca), fatiga y síndrome mano-pie (palmas y plantas de los pies enrojecidos o doloridos).

Avise a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

### Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de capecitabina cuando se administran conjuntamente, dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. Asimismo, capecitabina también puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Advierta a su médico si está tomando anticoagulantes orales (por ejemplo Sintrom®) o si padece problemas hemorrágicos puesto que el tratamiento con capecitabina puede dar lugar a un aumento del riesgo de hemorragias.

Mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Capecitabina no debe utilizarse durante el embarazo, si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. Las mujeres no deben dar el pecho durante el tratamiento con capecitabina.

### Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa

### Identificación

Xeloda comprimidos 150mg: recubiertos con película de color melocotón claro, de forma oblonga, biconvexa, con la marca "150" en uno de los lados y "Xeloda" en el otro.

Xeloda comprimidos 500mg: recubiertos con película de color melocotón, de forma oblonga, biconvexa, con la marca "500" en uno de los lados y "Xeloda" en el otro.



## ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: \_\_\_\_\_

	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

OBSERVACIONES:

---



---



---



---

### Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO  
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO