



RITONAVIR

¿Qué es y para qué se utiliza?

Ritonavir es un inhibidor de la proteasa que se utiliza normalmente como potenciador del efecto de otros inhibidores de la proteasa para el tratamiento de la infección por el VIH.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

NORVIR CAPS 100MG E/84

NORVIR SOL 80MG/MLI E/5

¿Cómo se debe conservar?

Conservar en nevera entre 2-8°C.

¿Cómo se administra?

Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua.

Tanto las cápsulas como la solución oral deben tomarse preferiblemente CON alimentos.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Cuando se utiliza como potenciador se administra en dosis bajas, por lo que no suelen aparecer efectos secundarios significativos relacionados con ritonavir.

Los efectos adversos vendrán asociados al resto de fármacos antirretrovirales que formen parte de su terapia.

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de ritonavir. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. No se recomienda la lactancia materna durante el tratamiento.

Excipientes de declaración obligatoria

NORVIR® CÁPSULAS BLANDAS: Alcohol, Aceite de Ricino, Sorbitol, Glicerina.

NORVIR® SOLUCIÓN: Etanol, Aceite de Ricino, Propilenglicol,

Identificación

NORVIR® CAPSULAS 100MG: blanca con "Abbott A" y el código "DS 100" impreso en la cubierta en tinta negra.

NORVIR® SOLUCIÓN: solución naranja, prácticamente transparente.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**