



## ATAZANAVIR/COBICISTAT (EVOTAZ®)



### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Atazanavir es un inhibidor de la proteasa, que combinado con otros medicamentos antirretrovirales, está indicado en el tratamiento de la infección por VIH. Cobicistat se utiliza como potenciador del efecto de Atazanavir.

### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

EVOTAZ Comp 300 MG/150 MG E/30

### ¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (inferior a 30°C)

### ¿Cómo se administra?

La pauta habitual es de un comprimido al día, por vía oral, entero (sin masticar), CON alimentos.

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado tomar una dosis y no han transcurrido 12 horas desde la hora habitual en que la suele tomar, tome la dosis prescrita con alimentos lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 horas desde la hora habitual en que la suele tomar, no debe tomar la dosis olvidada y espere a tomar la siguiente dosis a la hora habitual.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados a atazanavir/cobicistat se han descrito: náuseas (también vómitos, diarrea, dolor abdominal, sequedad de boca), aumento de la bilirrubina en sangre acompañada o no de ictericia (que se pueden manifestar como aparición de tono amarillento de la piel y/o los ojos, orina oscura), dolor de cabeza, mareo somnolencia, insomnio, sueños anormales, erupciones cutáneas, fatiga y posible aumento de sangrado en pacientes hemofílicos,

### Observaciones

El éxito del tratamiento depende de su correcto cumplimiento. No deje de tomar su medicación sin avisar a su médico.

Atazanavir/cobicistat puede interferir con el efecto de otros medicamentos. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

El tratamiento antirretroviral no ha demostrado disminuir el riesgo de contagio del virus a otras personas, por lo que éstas deben tomar las medidas de prevención adecuadas.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo NO HORMONAL eficaz durante el tratamiento. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. Evite la lactancia materna durante el tratamiento.

### Excipientes de declaración obligatoria

### Identificación

EVOTAZ®: Comprimido recubierto con película, rosa, ovalado, biconvexo, con unas dimensiones aproximadas de 19 mm x 10,4 mm, marcado con "3641" en una cara y liso en la otra.



## ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

**PACIENTE:** \_\_\_\_\_

																	
8		10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22	23		

OBSERVACIONES:

---

---

---

---

### ***Y recuerde.....***

**Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico**

**Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarlo aunque tenga síntomas similares a los suyos**

**Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta**

**Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños**

**No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)**

**Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original**

**Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital**

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO  
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**